




PROPOSTA DI FLOW CHART PER IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO PER L'ADHD

Dott. Massimo Molteni *

*Istituto Scientifico Eugenio Medea IRCCS – Bosisio Parini (LC)

Centro Bosisio Parini





**PERCORSO
DIAGNOSTICO**

ANAMNESI ◊

QUESTIONARI
(almeno uno) ◊

Intervista diagnostica
K-SADS o DAWBA * ◊

VISITA NPI / ESAME NEUROLOGICO ◊

VALUTAZIONE COGNITIVA
(Scale Wechsler / matrici di Raven) ◊

Eventuale approfondimento
NEUROPSICOLOGICO (se anamnesi
o esame obiettivo positivi) ●

CBCL * ◊

Conner's * ◊

Social Responsiveness Scale

Per sospetta comorbidità
neuropsichiatrica (da anamnesi
visita NPI, intervista, CBCL)

**Valutazione attentiva / funzioni
esecutive** ●

**Valutazione apprendimenti
scolastici** ●

Valutazione linguaggio ●

**Valutazione della
coordinazione motoria e aspetti
visuo-spaziali** ●

◊ informazioni necessarie nel registro
● informazioni inseribili nel registro, ma
non indispensabili

ADOS / ADI

CDI – MASC – SAFA - Y-BOCS

Torre di Londra
Test MF
Test di Stroop Numeri
Batterie valutaz., Attenzione
BRIEF

Prove MT (lettura e comprensione)
AC-MT /BDE 2
Analisi della scrittura


Batterie per la valutazione della
comprensione e dell'espressione

ABC movement - VMI


* Possibili On line



* Salvo necessità specifiche: i pazienti possono contattare il centro



◇ informazioni necessarie nel registro





CONFERMA DIAGNOSTICA
ATTRIBUZIONE CGI-S

CGI \geq 5

INTERVENTO FARMACOLOGICO

DOSE TEST METILFENIDATO
IMPOSTAZIONE ATOMOXETINA
◇

CONTROLLO A 1 SETTIMANA, 1 MESE, 3 MESI, 6 MESI E POI OGNI 6 MESI con SNAP e CGI-S /CGI-I ◇

ALTRI FARMACI DA SOLI O IN CO-TERAPIA: EVENTUALI CONTROLLI AGGIUNTIVI

INTERVENTO PSICOLOGICO

PARENT TRAINING
gruppo / individuale

TRATTAMENTO INDIVIDUALE

IPOZZABILE CT DI GRUPPO
SE PRENDE FARMACO

INDICAZIONI PER LA SCUOLA

TRATTAMENTI SPECIFICI PER
COMORBIDITÀ

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE /
TRATTAMENTO PSICOEDUCATIVO /
SUPPORTO EDUCATIVO TRATTAMENTO NPS

FOLLOW – UP
Somministrazione SNAP ◇
CGI – S; CGI – I ◇

SEGUE CONTROLLI FARMACOLOGICI
(vedi sopra)

SE NON ACCETTA FARMACO: OGNI 6
MESI O SECONDO NECESSITÀ CLINICA

◇ informazioni necessarie nel registro