Azienda Ospedaliera
SPEDALI CIVILI BRESCIA

MN
ISTITUTO DI RICERCHE
FARMACOLOGICHE
MARIO NEGRI
I R C C S

CONVEGNO

Uso razionale degli psicofarmaci in età evolutiva (per il trattamento dell'ADHD)

Milano, 21 giugno 2016

Principi di psicofarmacologia clinica

(efficacia e sicurezza, uso off-label,
schemi terapeutici, ...)

Maurizio Bonati, Clavenna Antonio

Dipartimento di Salute Pubblica

Laboratorio per la Salute Materno Infantile

Nome: **Maurizio Bonati**

Ente di appartenenza: **IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano**

Impiego nell'industria farmaceutica o di altri settori nel corso degli ultimi cinque anni;
appartenenza al personale;
attività varie (consulenza, etc.);
interessi finanziari nel capitale;
benefici diretti o indiretti;
altri interessi o fatti a beneficio del proprio nucleo familiare: **NESSUNO**

In fede:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Bonati', written on a white rectangular background.

Milno, 21 giugno 2016

Prologo

PSYCHOTROPIC DRUGS

Edited by

S. GARATTINI AND V. GHETTI

MILAN (ITALY)

ELSEVIER PUBLISHING COMPANY

AMSTERDAM - LONDON - NEW YORK - PRINCETON

1957

ELSEVIER

Dipartimento di Salute Mentale

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

PSICHIATRIA: biologia e metodo scientifico

a cura di MAURIZIO BONATI e GIANNI TOGNONI

1971 (1969)

Setting: Modena scuole materne

Popolazione: Bambini 3-6 anni e le maestre

Risultati: Survey 150/629 (25%) **disturbi (turbe) del comportamento** (aggressività, crisi di collera, isolamento, mutacismo, anoressia nervosa, vomito, enuresi notturna, encopresi, ...)

Trattamento: 4-6 mg/die periciazina (Neuleptil®) i bambini sono più “**adattati, socievoli, tranquilli**” ...

Conclusioni: “il farmaco si è dimostrato elettivamente socializzante anche per il bambino di 3-6 anni frequentante la scuola materna”

**Neonati
pretermine**

< 36 settimane di
gestazione

Sopravvivenza

**Neonati a
termine**

0-27 giorni

Adattamento

Lattanti

28 giorni –
23 mesi

**Crescita e
proliferazione**

Bambini

2 - 11 anni

Differenziamento

Adolescenti

12 - 17
anni

Riproduzione

A hand holding a blue marker is drawing a white outline of a human head in profile on a whiteboard. Inside the head outline, a detailed white line drawing of a brain is being completed. The background is a blurred image of a person's face.

What is psychiatry? Co-producing complexity in mental health

Già in carico
alla Struttura

Altro
specialista

Neuropsichiatra
privato

Altra sede stessa
UONPIA

Medico Curante

Altra
UONPIA

Genitori

Psicoterapeuta

Ospedale

Psicologo

Altri parenti

Servizi sociali

Tribunale

Scuola

Condition	N	Cases per 1000
All children with chronic conditions	5332	307.6
<i>Impairments</i>		
Musculoskeletal impairments	232	15.2
Deafness and hearing loss	241	15.3
Blindness and vision impairments	220	12.7
Speech defects	388	26.2
Cerebral palsy	34	1.8
<i>Diseases</i>		
Diabetes	25	1.0
Sickle cell disease	26	1.2
Anemia	139	8.8
Asthma	747	42.5
Respiratory allergies	1746	96.8
Eczema and skin allergies	557	32.9
Epilepsy and seizures	34	2.4
Arthritis	79	4.6
Heart disease	272	15.2
Frequent or repeated ear infections	1480	83.4
Frequent diarrhea/bowel trouble	308	17.1
Digestive allergies	398	22.3
Frequent or severe headaches	419	25.3
Other	344	19.8

Source – Original tabulations of the 1988 National Health Interview Survey

Health concern	5–12 years		13–18 years	
	Male	Female	Male	Female
Anxiety	8.2	7.3	10.8	10.4
Attention	13.8	6.2	12.5	5.1
Behaviour	12.0	5.7	10.5	6.1
Learning problems	9.9	4.5	6.5	4.5
Depression	2.6	1.7	4.6	5.8
Developmental delay or ID	2.1	0.9	1.1	1.0
Asthma	23.2	17.9	22.6	20.4
Chronic respiratory	1.4	1.3	2.1	2.4
Chronic allergies	9.2	8.8	13.9	12.8
Chronic orthopaedic	3.4	3.6	10.5	8.8
Chronic rheumatic	0.1	0.1	0.2	0.1
Dental	11.9	14.2	16.2	22.7
Diabetes	0.3	0.2	0.3	0.3
Epilepsy	0.3	0.3	0.6	0.6
Hearing impairment	2.6	1.8	1.2	2.0
Sleep disturbance	4.8	3.1	6.6	6.7
Speech problems	5.8	2.1	1.9	1.5
Vision problems	7.2	7.8	9.9	14.7

Psicofarmaci

RESEARCH CONDUCT

No correction, no retraction, no apology, no comment: paroxetine trial reanalysis raises questions about institutional responsibility

SHORT HISTORY OF PAROXETINE AND STUDY 329

1992 >>>

FDA approves paroxetine for adults with depression

1994–1998 >>>

SmithKline Beecham conducts Study 329, a randomised placebo controlled trial of paroxetine in 275 adolescents with depression

2001 >>>

Keller and colleagues publish Study 329 in the *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*. Authors conclude that “paroxetine is generally well tolerated and effective”

2002 >>>

FDA states that Study 329 “should be considered as a failed trial.” This year, over two million paroxetine prescriptions are written “off-label” for US children and adolescents. *A Panorama* investigation takes a critical look at Seroxat use in the UK

2003 >>>

UK Committee on Safety of Medicines recommends that paroxetine not be used in children and adolescents with depression, citing concerns of increased risk of self-harm and potentially suicidal behaviour

2004 >>>

FDA places black box warning, its most serious warning, on all antidepressants, stating that they increase the risk of suicidal thinking and suicidal behaviour in these age groups

2012 >>>

GlaxoSmithKline agrees to pay £2bn in largest ever US healthcare fraud settlement, partly for fraudulently promoting paroxetine

2013 >>>

April-May: Jon Jureidini (right) writes to GSK requesting help in getting Keller and colleagues’ paper retracted; GSK responds that “GSK does not agree that the article is false, fraudulent or misleading”

June: *The BMJ* publishes the restoring abandoned and invisible trials (RIAT) declaration; GSK expresses its support for RIAT, stating that “by making the clinical study reports available we are very happy for others to publish on the records if they wish to and if journals consider the work to be of scientific merit”

July: Jureidini announces his team’s intent to republish Study 329 in accordance with the RIAT initiative

2015 >>>

The BMJ publishes RIAT reanalysis of Study 329. The seven restorative authors conclude: “Neither paroxetine nor high dose imipramine showed efficacy for major depression in adolescents, and there was an increase in harms with both drugs”

AMP, BV and JV have no conflict of interest to declare. CA has been a consultant to or has received honoraria or grants from Abbot, AMGEN, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Caja Navarra, CIBER-SAM, Fundación Alicia Koplowitz, Instituto de Salud Carlos III, Janssen Cilag, Lundbeck, Merck, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Economía y Competitividad, Mutua Madrileña, Otsuka, Pfizer, Roche, Servier, Shire, Takeda and Schering Plough. JKB has been in the past 3 years a consultant to/member of advisory board of/and/or speaker for Janssen Cilag BV, Eli Lilly, Shire, Lundbeck, Roche and Servier. He is not an employee of any of these companies, and not a stock shareholder of any of these companies. He has no other financial or material support, including expert testimony, patents, royalties. CUC has been a consultant and/or advisor to or has received honoraria from: AbbVie, Alkermes, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Genentech, Gerson Lehrman Group, IntraCellular Therapies, Janssen/J&J, Lundbeck, MedAvante, Medscape, Otsuka, Pfizer, ProPhase, Reviva, Roche, Sunovion, Supernus, and Takeda. He has received grant support from BMS, Otsuka, and Takeda. JCG has undertaken consultancy work for Boehringer Ingelheim and is a former employee of Solvay Pharmaceuticals, but there is no conflict of interest to the topics presented in the current manuscript. PJH has been paid member of advisory boards of Shire and Eli Lilly. CM has been a consultant for Janssen-Cilag, Otsuka, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, CIBERSAM, Instituto de Salud Carlos III, Spanish Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, and Fundación Alicia Koplowitz. AZ has received research grants or served as speaker, adviser, or consultant for Otsuka, Lilly, Lundbeck, Shire and Vifor Pharma

Uso razionale degli psicofarmaci

Doctor

- ✓ Una completa anamnesi medica e psichiatrica (presente e remota) del paziente ma anche familiare consente di scegliere la terapia (non solo farmacologica) più appropriata e di aumentare la compliance sia del paziente che della famiglia.
- ✓ Un colloquio anamnestico dovrebbe prevedere la valutazione dell'intero spettro psicopatologico, non limitandosi alla raccolta dei sintomi correlati con il motivo della richiesta.

ADHD

PAGINA INIZIALE

PRIMA VISITA - 1

Primo contatto con il centro di riferimento

Anamnesi personale

Anamnesi familiare

Valutazione

Diagnosi

Prescrizione

Esame obiettivo

Esami strumentali

Fine prima visita

Uscita del paziente dal registro

Anamnesi familiare

ADHD->PRIMA VISITA - 1->Anamnesi familiare

ANAMNESI PADRE

Ignota Si

No

Presenza di patologie? Si

No

ANAMNESI FAMIGLIA PATERNA

Ignota Si

No

Vari aspetti dell'anamnesi del padre

- Sospetto di ADHD
- Disturbi dell'apprendimento
- Depressione
- Ansia
- Cefalea
- Epilessia/ convulsioni
- Abuso di sostanze
- Disturbi schizofrenici
- Disturbo ossessivo compulsivo
- Tic/ sindrome di Tourette
- Disturbo di condotta/ problemi con la legge
- Mania
- Disturbi pervasivi dello sviluppo
- Altre patologie neurologiche
- Altre patologie psichiatriche
- Altre patologie croniche

Una prescrizione farmacologica è un atto medico che necessita di una valutazione medica della condizione del paziente. È quindi necessario stabilire prima della somministrazione di uno psicofarmaco se:

- ✓ il paziente è affetto da qualche patologia oltre al disturbo psichiatrico;
- ✓ sta assumendo farmaci (anche omeopatici o “alternativi”), sostanze illecite;
- ✓ è allergico a qualche farmaco;
- ✓ ha una storia familiare o personale di patologie associate ad un aumentato rischio di effetti avversi.

Test ematochimici ed esami strumentali in alcune situazioni dovrebbero essere eseguiti prima dell'inizio della terapia in base al tipo di farmaco e ripetuti per controllo a intervalli prestabiliti in base alle recenti linee guida.

	Valutazione pre-trattamento	Monitoraggio settimanale per le prime 6 settimane	Monitoraggio a 3 mesi	Monitoraggio successivo ogni 6 mesi	Monitoraggio regolare durante il trattamento, specialmente durante la titolazione
Peso	X	X	X	X	
Altezza	X			X	
Circonferenza vita e fianchi	X			X	
Frequenza	X		X	X	
Pressione	X		X	X	
Glicemia a digiuno	X		X	X	
HbA _{1c}	X		X	X	
Profilo lipidico	X		X	X	
Prolattinemia	X		X	X	
Disordini del movimento (sintomi extrapiramidali, acatisia, distonia e discinesia tardiva)	X				X
ECG	X				
Efficacia					X
Effetti avversi					X
Aderenza					X

The image shows four black silhouettes of people standing in a row, facing each other as if in a meeting or discussion. The background is a bright, slightly blurred outdoor scene with buildings and trees. A white text box is overlaid on the lower half of the image.

L'interazione con il **pediatra di famiglia** o il medico di famiglia è utile per la definizione completa dello stato di salute del paziente e la gestione della cura. Analogamente la comunicazione con gli **insegnanti**, gli **psicologi** o altre figure professionali che hanno contribuito (o possono contribuire) alla completa e accurata definizione dell'anamnesi è importante per la definizione della terapia (non solo farmacologica), il suo controllo, la compliance e l'outcome terapeutico.

Postulata la diagnosi, considerate le diverse possibili cause etiologiche dei sintomi (biologiche, psicologiche e sociali) il percorso terapeutico deve essere dettagliato e compreso sia dal paziente che dai genitori circa i trattamenti necessari (farmacologici e non farmacologici), la tempistica, le modalità per accertarsi dell'efficacia/miglioramento e controllare i potenziali effetti avversi.

A cura dei
Centri di riferimento per l'ADHD
della Regione Lombardia
aderenti al Progetto Regionale
«Condivisione di percorsi
diagnostico-terapeutici per l'ADHD»

ADHD

Guida per i genitori

Regione Lombardia

Centro
Studi
Erickson

7. Percorsi di Parent Training

Perché proporre un programma di Parent Training?

Il lavoro con il bambino, a volte, non è sufficiente per produrre l'apprendimento di adeguati comportamenti a casa e a scuola.

La famiglia è una risorsa importante per favorire i comportamenti positivi del bambino, soprattutto nell'età prescolare; l'istinto materno e paterno, ovvero la disponibilità dei genitori ad affrontare le problematiche sollevate dal figlio con ADHD, però non sono sufficienti a modificare i comportamenti iperattivi e/o la disattenzione.

È quindi indispensabile, nell'ottica dell'approccio multimodale, intervenire sui genitori attraverso la psicoeducazione e la terapia cognitivo-comportamentale, chiamata *Parent Training*.

Per *Parent Training* si intende un'attività di formazione di gruppo diretta da conduttori esperti e rivolta ai genitori di bambini con particolari difficoltà, al fine di **sviluppare maggiore consapevolezza e competenza** nella risoluzione di problematiche inerenti la gestione e l'educazione dei figli.

Una fase di prova con la sola terapia cognitivo-comportamentale al bambino e la psicoeducazione ai genitori, per valutare se le potenzialità del paziente nonché del contesto familiare riescano da sole a gestire le problematiche comportamentali (per 2-6 mesi circa).

FASE 1

COUNSELING O INTERVENTO PSICOEDUCATIVO
MONITORAGGIO SETTIMANALE

VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA DOPO 1 MESE

NO

SI

MONITORAGGIO
MENSILE

FASE 2

INTERVENTO PSICOTERAPICO
MONITORAGGIO MENSILE

VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA DOPO 2-3 MESI

NO

SI

RIVALUTAZIONE:
Diagnosi e le possibili comorbidità, fattori di
mantenimento familiari e sociali, trattamento.
INTERVENTI DERIVANTI DA QUESTA
VALUTAZIONE

FASE DI
CONTINUAZIONE

SI

VALUTAZIONE DELLA **RISPOSTA**

NO

FASE 3

Sebbene sia raccomandabile iniziare con un trattamento psicologico prima di ricorrere agli psicofarmaci spesso la gravità dei sintomi è tale, da dover iniziare subito un trattamento farmacologico (p.es. ADHD complesso con gravi disturbi di iperattività, disturbo ossessivo compulsivo con sintomatologia psicotica, depressione medio-grave).

Farmaco

- ADHD grave (CGI-S>4)
- ADHD lieve-moderato

Trattamento psicologico

- ADHD lieve-moderato (CGI-S<5)
- ADHD grave

Un trattamento con psicofarmaci consta di tre fasi:

- ✓ una fase acuta che dopo l'inizio della terapia prevede un **aggiustamento** del dosaggio per massimizzare l'effetto minimizzando gli effetti avversi;
- ✓ una fase di **mantenimento** che consolida l'efficacia sino alla remissione o recupero considerevole della sintomatologia;
- ✓ la **sospensione** della terapia.

Queste tre fasi devono essere illustrate e motivate sia al paziente che ai genitori. La partecipazione informata del paziente e della famiglia (azione psicoeducativa) è importante sin dall'inizio della terapia. Tale pianificazione andrebbe condivisa con la famiglia prima dell'inizio del trattamento.

Selezione del trattamento	Dosaggio iniziale	Titolazione
<p>Metilfenidato (a rilascio immediato)</p> <p>o</p> <p>Metilfenidato (a rilascio modificato)</p> <p>o</p> <p>atomoxetina</p>	<p>Un'unica somministrazione giornaliera è utile per i bambini ed evita che la somministrazione farmacologica venga effettuata dal personale scolastico</p> <p>La doppia somministrazione giornaliera è utile nei bambini che presentano sintomi comportamentali anche nella seconda parte della giornata</p>	<p>Aumentare ogni 1-3 settimane fino al dosaggio massimo o possibile se gli effetti collaterali limitano l'ulteriore aumento</p> <p>Obiettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - remissione sintomi ADHD - no effetti avversi <p>La valutazione dei questionari compilati dai genitori e dagli insegnanti è utile per gestire in modo appropriato l'incremento del dosaggio</p>

	Farmaco	T _{max} (ore)	t _{1/2} (ore)
Antipsicotici			
Tipici	aloperidolo	2-6 (orale) 20 min (<i>im</i>)	12-33 (orale) 13-36 (<i>im</i>)
	clorpromazina	2-3	6 (2-119)
	litio	0,5-3	18-24
	perfenazina	10 min	8,4-12,3
	periciazina	5	7
	pimozide	6-8	66
	promazina	20-30 min	6
	tiapride	0,5-1	3-5
Atipici	amisulpride	1,5-4	12
	aripiprazolo	3-5	75-146
	clozapina	2,1	14,2
	olanzapina	5-8	21-54
	paliperidone	24 (orale) 13 giorni (<i>im</i>)	23 (orale) 25-49 giorni (<i>im</i>)
	quetiapina	1,5	7
	risperidone	1-2	3
	ziprasidone	6-8	6,6
Ansiolitici/ipnotici			
Ansiolitici	alprazolam	1-2	12-15
Ipnotici	valeriana	n.d.	n.d.
	zolpidem	0,5-3	2,4-6

Segue

	Farmaco	T _{max} (ore)	t _{1/2} (ore)
Antidepressivi			
Triciclici	amitriptilina	2,2-4,7	13-36
	clomipramina	1,5-2,5	12-36 (orale) 20-40 (<i>im</i>)
	imipramina	18	19
	nortriptilina	4-6	12
SSRI	citalopram	4	33-37
	escitalopram	3-4	27-32
	fluoxetina	6-8	2-7 giorni
	fluvoxamina	2-8	12-20
	paroxetina	5-6	24
	sertralina	4,5-8,4	26
Altri	bupropione	5	20
	duloxetina	6	8-17 10,4 (B)
	iperico	4-6	37
	reboxetina	2	13
	venlafaxina	2-3	3-13
	Stabilizzatori del tono dell'umore		
	acido valproico	4-24	12-16
	carbamazepina	2-24	25-65
	topiramato	2-3	21
Farmaci per l'ADHD			
	atomoxetina	1-2 (B)	3,6-21 (B)
	clonidina	1-3	6-20
	metilfenidato	1-2 (1,5-4,5)* (B)	2 (B)
	modafinil	2-4	7-15

* formulazione a rilascio prolungato; (B) = bambino

Ogni prescrizione di psicofarmaci deve essere specifica, intesa come piano terapeutico e deve includere: la **dose d'attacco** (iniziale), i tempi (indicativi) della **modifica del dosaggio**, la **dose massima prevista** o i livelli ematici da raggiungere e mantenere, la durata della cura (previsione), strategie di **verifica della cura** (p.es. giudizio del paziente, dei genitori, degli insegnanti), **possibili alternative** se la cura non risultasse efficace.

Disturbo	Linea Guida/ Farmaci raccomandati	Uso autorizzato Italia	Dosaggio (die)*	Non raccomandati da LG
Depressione	NICE [CG28], 2005 (update 2015)			Paroxetina, venlafaxina, antidepressivi triciclici
	Fluoxetina	SI (≥ 8 anni)	Bambini: DI=5 mg; DM=10-20 mg; DMax=20 mg Adolescenti: DI=10 mg; DM=10-20 mg; DMax=40-60 mg	
	Sertralina	NO	Bambini: DI=25 mg; DM=25-50 mg; DMax=125-150 mg Adolescenti: DI=50 mg; DM=25-50 mg; DMax=200 mg	
	Citalopram	NO	Bambini: DI=10 mg; DM=10-20 mg; DMax=20 mg Adolescenti: DI=20 mg; DM=10-20 mg; DMax=40 mg	
Disturbo ossessivo compulsivo	CAGIG, 2014 AACAP, 2012 NICE [CG31], 2005			Antidepressivi triciclici (eccetto clomipramina), SNRI, antipsicotici in monoterapia
	Sertralina	SI (≥ 6 anni)	≥6 anni: DM=50-200 mg	
	Fluvoxamina	SI (≥ 8 anni)	≥8 anni: DI=25 mg; DM=25-200 mg; DMax=200 mg	
	Fluoxetina	NO	≥8 anni: DM=10-20 mg	

DI= dose iniziale; DM= dose di mantenimento; DMax= dose massima

MPH IR BID
MPH (mg/mL)

% IR

% ER

100%

EQUASYM XL
MPH (mg/mL)

30%

70%

MEDIKINET RETARD
MPH (mg/mL)

50%

50%

Iniziata la terapia, la frequenza delle visite nella fase di mantenimento dipende dai risultati (**risposta**), dall'**aderenza al piano terapeutico**, dal **grado di compromissione funzionale** e dalla **comparsa di effetti avversi** (p.es. discinesia tardiva da antipsicotici, riduzione marcata di peso da antidepressivi o psicostimolanti, o aumento da antipsicotici o litio), dalla **variazione del quadro clinico e diagnostico** (p.es. comparsa di comorbidità).

In pazienti con gravi comorbidità o quadri psicopatologici complessi il **ricorso contemporaneo a psicofarmaci di classe differente** può essere giustificato (p.es. un antipsicotico e un SSRI per TIC e disturbo ossessivo compulsivo, uno stabilizzante e un antipsicotico per disturbo bipolare).

Dovendo sospendere la terapia in un paziente che sta assumendo due farmaci giustificati per lo stesso disturbo **il primo da sospendere dovrebbe essere quello aggiunto** (p.es. la benzodiazepina o l'antipsicotico aggiunti alla clomipramina in un paziente con disturbo ossessivo compulsivo per ridurre l'ansia, oppure un adolescente con grave depressione a cui si è aggiunto il litio all'antidepressivo).

E' essenziale valutare anche sia i potenziali effetti avversi che il quadro clinico entrambi a lungo termine dei farmaci da sospendere (p.es. in un adolescente bipolare in terapia iniziata con antipsicotico e aggiunto litio, dovrebbe essere sospeso dapprima l'antipsicotico).

The background of the slide features a vibrant, abstract design. It consists of several black silhouettes of people in various celebratory poses, such as jumping and raising their arms. These silhouettes are set against a backdrop of large, colorful splashes in shades of pink, light blue, purple, and lime green. The overall composition is dynamic and positive, suggesting a sense of achievement or recovery.

Quando le condizioni cliniche lo consentono e viene decisa la **riduzione del dosaggio sino alla possibile sospensione della terapia** questa fase deve essere attentamente presentata e discussa con il paziente e i genitori (p.es. dopo un adeguato periodo di assenza di sintomi nella depressione). Il **controllo** della cura (visite) deve proseguire **anche dopo la sospensione del farmaco** per un tempo adeguato a prevenire ricadute anche a distanza (p.es. un controllo dei 6-12 mesi successivi alla sospensione di una terapia ansiolitica ad un bambino con disturbi d'ansia, inizio della scuola nei disturbi d'ansia, l'inverno per i disturbi affettivi).

transition

Psicofarmaci e bambini: tollerabilità e sicurezza di impiego

Eventi avversi da farmaci ADHD: *number needed to harm* (NNH)

Evento	AMP	MPH	ATX	GUA	CLO
≥ 1 EA	6 (4-10)	-	7 (5-13)	7 (5-10)	4 (2-50)
↓ appetito	3 (3-4)	3 (2-5)	9 (7-12)	-	-
Insonnia	8 (6-10)	6 (4-12)	n.r.	-	-
Dolore GI	-	11 (6-83)	10 (8-14)	22 (14-48)	-
Sonnolenza	-	-	19 (12-44)	5 (3.5-4.9)	4 (3-5)
Astenia	-	-	62 (38-182)	15 (11-21)	8 (5-15)
Cefalea	-	17 (10-71)	-	17 (10-52)	-
Irritabilità	19 (13-35)	-	-	33 (19-112)	-
Vertigini	39 (22-186)	20 (12-45)	53 (33-131)	-	-
Vomito	-	-	30 (16-171)	-	-

AMP=amfetamina (lisdexamfetamine); MPH= metilfenidato; ATX=atomoxetina; GUA=guanfacina; CLO=clonidina

Effetti indesiderati da farmaci ADHD: i dati del registro

Evento	N. segnalazioni	%	N. Bambini
↓ appetito	63	32	42
Cefalea	22	11	18
Irritabilità	15	8	13
Nausea	11	6	9
Tic	10	5	9
Dimagrimento	8	4	7
Sonnolenza	7	4	6
Astenia	6	3	3
Insonnia	6	3	5
<i>Altro</i>	<i>50</i>	<i>24</i>	-
Totale	198	100	86 (29%)

Eventi avversi da farmaci ADHD: avvertenze Food and Drug Administration (in grassetto: black box warning)

AMP	MPH	ATX	GUA	CLO
Dipendenza*	Dipendenza*	Ideazioni suicidarie*	Ipotensione, bradicardia, sincope	Ipotensione, bradicardia, sincope
Eventi CV gravi*	Eventi CV gravi	Eventi CV gravi	Sedazione, sonnolenza	Sedazione, sonnolenza
↑ PA e FC	↑ PA e FC	↑ PA e FC	Alterazioni conduzione cardiaca	Alterazioni conduzione cardiaca
Eventi avversi psichiatrici	Eventi avversi psichiatrici	Eventi avversi psichiatrici		
↓ crescita	↓ crescita	↓ crescita		
Priapismo	Priapismo	Priapismo		
Convulsioni	Convulsioni	Epatotossicità		
Vasculopatia periferica	Vasculopatia periferica	Reazioni allergiche		
Disturbi visivi	Disturbi visivi	Ritenzione urinaria		

Prima del trattamento con farmaci per l'ADHD

- Esame obiettivo e neurologico
- Misurazione **altezza e peso**
- Misurazione **pressione arteriosa e frequenza cardiaca**
- **Anamnesi cardiovascolare** (personale e familiare)
- Valutazione **rischio di disturbi psichiatrici** e di **abuso di sostanze**

Monitoraggio terapia con farmaci per l'ADHD

Clinico

settimanale (titolazione del farmaco); mensile (fase di mantenimento).

Insorgenza o peggioramento di comportamenti aggressivi, ostilità, labilità emotiva o **comportamenti suicidari**.

Sintomi **maniacali o psicotici**, allucinazioni, idee deliranti.

Convulsioni o aumento della frequenza delle convulsioni

Insorgenza o peggioramento di **tic** motori e verbali (MPH)

Uso inappropriato e abuso (MPH)

Strumentale

Pressione arteriosa e frequenza cardiaca su un grafico percentile dopo ogni aggiustamento della dose e successivamente almeno ogni sei mesi

Crescita e sviluppo nei trattamenti a lungo termine, da riportare su una curva di crescita.

Funzionalità epatica (atomoxetina)

Rischio di aritmia nei bambini trattati con metilfenidato

	N.	Rischio Relativo (IC95%)
Esposti	234	1
Non esposti	630	1,61 (1,48 – 1,74)
<i>Giorni dall'inizio della terapia</i>		
1-3	24	2,01 (1,74-2,31)
4-7	26	1,61 (1,40-1,84)
8-14	35	1,33 (1,17-1,50)
15-28	45	1,29 (1,16-1,44)
29-56	51	1,54 (1,38-1,71)
>56	53	1,03 (0,91-1,15)

Eventi avversi da farmaci ADHD: breve versus lungo termine

EFFETTI INDESIDERATI DEGLI ANTIPSIKOTICI

- **Sintomi antimuscarinici**
- **Sintomi a carico del SNC**
- **Sintomi extrapiramidali** (più raramente con antipsicotici atipici):
 - ✓ **sintomi parkinsoniani**
 - ✓ **distonie e discinesie acute;**
 - ✓ **acatisia**
 - ✓ **discinesia tardiva**
- **Sindrome neurolettica maligna**
- **Effetti cardiovascolari**
- **Discrasie ematiche: agranulocitosi, leucopenia.**
- **Disturbi gastrointestinali**
- **Danno epatico e ittero**
- **Sindrome metabolica**
- **Iperprolattinemia**
- **Sintomi a carico della pelle e delle mucose**

EFFETTI INDESIDERATI DEGLI ANTIPSIKOTICI ATIPICI

Differenze tra farmaci

Evento	CLO	OLA	RIS	QUE	ZIP	ARI
↑ peso	++	++	+	+/-	+/-	+
Diabete	++	++	+	+/-	+/-	+
Dislipidemia	+	++	+	+/-	+/-	+/-
Sintomi extrapiramidali	-	+	++	+/-	++	+
Prolungamento QT	+	+/-	+	+/-	++	+/-
Prolattina	-	+/-	+	-	+/-	- (↓?)

Antipsicotici - Valutazione pre-trattamento e monitoraggio/1 (Linee guida NICE, 2013)

	Pre-trattamento	Settimanale (prime 6 settimane)	A 3 mesi	Successivo ogni 6 mesi	Monitoraggio regolare durante il trattamento, specialmente durante la titolazione
Peso ¹	X	X	X	X	
Altezza ¹	X			X	
Circonferenza vita e fianchi	X			X	
Frequenza	X		X	X	
Pressione	X		X	X	
Glicemia a digiuno	X		X	X	
HbA _{1c}	X		X	X	
Profilo lipidico	X		X	X	
Prolattinemia	X		X	X	
Disordini del movimento (sintomi extrapiramidali, acatisia, distonia e discinesia tardiva)	X				X ²
Note: ¹ Calcolare BMI; ² Anche se valutazione basale non disponibile (e ad ogni visita, se frequenti)					

Antipsicotici - Valutazione pre-trattamento e monitoraggio/2

(Linee guida NICE, 2013)

	Pre-trattamento	Settimanale (prime 6 settimane)	A 3 mesi	Successivo ogni 6 mesi	Monitoraggio regolare durante il trattamento, specialmente durante la titolazione
Stato nutrizionale, dieta e livello di attività fisica	X				X
Livello di tollerabilità dei possibili effetti avversi	X				
ECG	X ³				
Efficacia					X
Effetti avversi					X
Aderenza					X

Note:

³Se è presente almeno uno tra i seguenti: specifico rischio cardiovascolare all'esame fisico (come ad esempio la diagnosi di ipertensione arteriosa), storia personale di malattia cardiovascolare, storia familiare di malattie cardiovascolari, come morte cardiaca improvvisa o prolungamento dell'intervallo QT, o il bambino, o l'adolescente è in regime di ricovero.

Antidepressivi – Effetti indesiderati

	AMITRIPTILINA	IMIPRAMINA	CITALOPRAM	FLUOXETINA	FLUVOXAMINA	PAROXETINA	SERTRALINA
Anticolinergici	++++	+++	+			+	
Sonnolenza	++++	+++	+		+++	+	+
Insonnia/agitazione		+		++			+
Ipotensione ortostatica	++++	++++					
Aritmie	+++	+++					
Disturbi gastrointestinali		+	+++	+++	++++	+++	+++
Aumento di peso	++++	+++					

Monitoraggio terapia con antidepressivi

Clinico	Insorgenza o peggioramento di comportamenti aggressivi, ostilità, labilità emotiva o comportamenti suicidari .
	Sintomi maniacali o psicotici , allucinazioni, idee deliranti.
	Convulsioni o aumento della frequenza delle convulsioni
	Sviluppo cognitivo e comportamentale
Strumentale	Funzionalità piastrinica in pazienti con anamnesi di disturbi della coagulazione o nel caso di co-somministrazione di farmaci che aumentano il rischio di emorragie.
	Crescita da riportare su una curva di crescita.
	Glicemia: nei pazienti diabetici può essere necessario aggiustare il dosaggio dell'insulina o degli ipoglicemizzanti orali.

FDA Advisory Committee

14 Settembre 2004

Antidepressant “Black Box” Warning On Suicidality Risk Recommended By Joint Committee.

A “black box” warning on the risk of suicidality in pediatric patients should be added to antidepressant drug labeling, a joint FDA advisory committee concluded.

European Medicines Agency
Press office

London, 25 April 2005
Doc. Ref. EMEA/CHMP/128918/2005 corr

European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents

Monitoraggio terapia con antidepressivi

9a raccomandazione

“Pensieri di morte e rischio suicidario rappresentano sintomi chiave del disturbo depressivo, sono tipicamente presenti prima di iniziare il trattamento e rappresentano sintomi target del trattamento, possono persistere finché non si verifica una significativa remissione della sintomatologia depressiva. Pertanto, in tutti i casi è necessaria una supervisione ravvicinata (circa ogni settimana nel primo mese), basandosi sulle necessità individuali di pazienti ad alto rischio, al fine di: sostenere la compliance (che può ridursi per una assenza iniziale di miglioramento), evidenziare lo stato mentale del paziente, l'efficacia, eventuali effetti collaterali, ma anche un peggioramento dei sintomi, o l'emergere di ideazioni suicidarie o di ostilità. E' necessario **avvertire il paziente e i familiari di porre attenzione ad un eventuale peggioramento dei sintomi, alla comparsa di comportamenti suicidari (ideazione, tentativi, autoaggressività) o ad inusuali modifiche comportamentali (autolesionismo, ostilità)**. La possibilità di insorgenza di rischio suicidario deve essere valutata sia dal medico che controlla la farmacoterapia sia da coloro che seguono il paziente in psicoterapia. Nel follow up necessario allertare i familiari anche della possibilità di esordio di sintomi ipo/maniacali.”

Terapia farmacologica prescritta – Registro lombardo (n=292)

Metilfenidato

Interazioni

Prolungamento dell'intervallo QT con aumento del rischio di aritmie cardiache: antiaritmici, antidepressivi triciclici, citalopram, escitalopram, **antipsicotici**, diuretici, fluorochinoloni, macrolidi, domperidone, fluconazolo, ketoconazolo, meflochina, ondansetron

Generic Name	Brand Names (Partial List)	Drug Class	Therapeutic Use	PubMed Search	Risk Category
Dexmethylphenidate	Focalin®, Focalin-XR®	CNS stimulant	ADHD	LINK	
Methylphenidate	Ritalin®, Concerta®, Focalin®, Daytrana®, Methylin®, Metadate CD®	CNS stimulant	ADHD	LINK	

Generic Name	Brand Names (Partial List)	Drug Class	Therapeutic Use	PubMed Search	Risk Category
Risperidone	Risperdal®	Antipsychotic, atypical	Schizophrenia	LINK

VOGLIO FARMACI
ADATTI A ME.
SPERIMENTAZIONE? OK.

SOLO GLI STUDI CLINICI CONDOTTI SUI BAMBINI
GARANTISCONO LA SICUREZZA E L'EFFICACIA DEI FARMACI PER LORO.
PARTECIPO ANCHE IO.

Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Bambino... ?

Off-label

Uso di un farmaco **al di fuori di quanto riportato nella sua “licenza di uso”**, in particolare in riferimento a:

- età
- indicazione
- dosaggio (dose/frequenza)
- via di somministrazione

Unlicensed

Uso di un farmaco :

- ✓ con licenza d'uso solo per l'adulto
- ✓ ricostituito o importato
(*senza licenza d'uso nella nazione*)
- ✓ sostanze/elementi chimici a scopo terapeutico

RISCHIO DI ADR ↑ CON PRESCRIZIONE OFF LABEL

Nazione	Anno	N. bambini	Durata	RR (IC95%)
<i>Ospedale</i>				
UK	1999	936	13 settimane	1,55 (1,19-2,03)
Germania	2004	156	8 mesi	1,08 (0,50-2,35)
Brasile	2008	265	5 mesi	2,44 (2,12-2,89)
<i>Territorio</i>				
Francia	2002	1.419	5 mesi	3,44 (1,26, 9,38)

Licenza pediatrica degli antipsicotici

Aloperidolo	No	≥ 3 anni	No
Clorpromazina	n.s.	≥ 1 anno	n.c.
Periciazina	Tutte	≥ 1 anno	n.c.
Pimozide	No	≥ 12 anni	≥ 12 anni
Promazina	≥ 12 anni	No	n.c.
Aripiprazolo	≥ 13 anni	≥ 13 anni	≥ 6 anni
Clozapina	≥ 16 anni	≥ 16 anni	No
Olanzapina	No	No	≥ 13 anni
Quetiapina	No	No	≥ 13 anni
Risperidone	≥ 5 anni	≥ 5 anni	≥ 5 anni
Ziprasidone	≥ 10 anni	n.c.	No

Licenza pediatrica degli antipsicotici

Aloperidolo	No	≥ 3 anni	No
Clorpromazina	n.s.	≥ 1 anno	n.c.
Periciazina	Tutte	≥ 1 anno	n.c.
Pimozide	No	≥ 12 anni	≥ 12 anni
Promazina	≥ 12 anni	No	n.c.
Aripiprazolo	≥ 13 anni	≥ 13 anni	≥ 6 anni
Clozapina	≥ 16 anni	≥ 16 anni	No
Olanzapina	No	No	≥ 13 anni
Quetiapina	No	No	≥ 13 anni
Risperidone	≥ 5 anni	≥ 5 anni	≥ 5 anni
Ziprasidone	≥ 10 anni	n.c.	No

Promazina (Talofen ®)

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'agitazione psicomotoria o del comportamento aggressivo.
Schizofrenia ed altri disturbi psicotici

Posologia e modo di somministrazione

Bambini: Talofen non va utilizzato in bambini al di sotto dei 12 anni a causa della mancanza di dati su efficacia e sicurezza.

Nei bambini sopra i 12 anni e negli adolescenti la dose orale raccomandata è di 5-15 gocce al giorno (10-30 mg/die), fino ad un massimo di 15 gocce 4 volte al giorno (120 mg/die). La dose parenterale è compresa tra i 0.25 e i 0.50 mg per kg di peso corporeo.

Promazina – Studi clinici disponibili

König HJ, Honkisch R, Rose A, Mittendorf M. [**Comparative clinical studies of oral premedication in childhood with reference to various pharmaceuticals**]. *Anaesthesiol Reanim.* 1990;15:311-20.

Ransome-Kuti O, Elebute O, Agosto-Odutola T, Ransome-Kuti S. **Intraperitoneal fluid infusion in children with gastroenteritis.** *Br Med J.* 1969;3(5669):500-3.

d' Hollander L, Fontaine PJ, Stassart-Deryck T. [**Clinical evaluation of the action of dixyrazine on behavioral disorders in children treated in a medico-pedagogic institution**]. *Acta Neurol Psychiatr Belg.* 1967;67:Suppl:5-35.

Licenza pediatrica degli antipsicotici

Aripiprazolo

D. bipolare

≥13

≥13

≥13

Schizofrenia

≥15

≥15

≥15

S. Tourette

No

No

≥7

Autismo

No

No

≥6

Risperidone

D. condotta

≥5

≥5

No

Schizofrenia

No

No

≥13

D. bipolare

No

No

≥10

Autismo

No

No

≥5

Licenza pediatrica degli SSRI

Paroxetina

No

No

No

Citalopram

No

No

No

Escitalopram

No

No

≥ 12 anni

Sertralina (DOC)

≥ 6 anni

≥ 6 anni

≥ 6 anni

Fluoxetina (depressione)

≥ 8 anni

≥ 8 anni

≥ 8 anni

Fluvoxamina (DOC)

> 8 anni

> 8 anni

≥ 8 anni

Prescrizione di psicofarmaci in età pediatrica in Italia. 2011 (prevalenza per 10.000 residenti)

0-5 anni		6-11 anni		12-17 anni		0-17 anni	
<i>Farmaco</i>	<i>prev</i>	<i>Farmaco</i>	<i>prev</i>	<i>Farmaco</i>	<i>prev</i>	<i>Farmaco</i>	<i>prev</i>
Trazodone	0,3	Risperidone	3,3	Sertralina	8,8	Risperidone	3,7
Risperidone	0,2	Metilfenidato	2,1	Risperidone	7,7	Sertralina	3,2
Escitalopram	0,2	Sertralina	1,0	Fluoxetina	3,4	Metilfenidato	1,3
Citalopram	0,2	Atomoxetina	0,6	Paroxetina	3,3	Fluoxetina	1,2
Sertralina	0,1	Periciazina	0,4	Escitalopram	2,3	Paroxetina	1,2
Venlafaxina	0,1	Pimozide	0,4	Aripirazolo	2,2	Amitriptilina	0,8
Duloxetina	0,1	Amitriptilina	0,3	Citalopram	1,8	Escitalopram	0,7
Paroxetina	0,1	Aripirazolo	0,2	Metilfenidato	1,6	Aripirazolo	0,7
Periciazina	0,1	Aloperidolo	0,2	Olanzapina	1,2	Citalopram	0,6
Quetiapina	<0,05	Clorpromazina	0,2	Atomoxetina	0,7	Olanzapina	0,4

In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ..., qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

(Decreto Legge 17 febbraio 1998, n 23)

SCIENZA

- dati documentabili
- uso noto e conforme a lavori comparsi su pubblicazioni scientifiche

COSCIENZA

- sotto la sua diretta responsabilità
- previa informazione del paziente e acquisizione del consenso

La richiesta (anche formale) di ricevere assenso e consenso al piano terapeutico (anche quando non prevede la prescrizione di farmaci) può rappresentare un passaggio importante nel rapporto terapeutico (e le responsabilità di ciascuno) tra medico, paziente e famiglia.

Nel corso di una terapia farmacologica l'informazione sul rationale della terapia, la comparsa di effetti collaterali (p.es. aumento di peso in un paziente obeso e familiarità di diabete II) o avversi (p.es. il prevalere di sintomi maniacali con antidepressivi, l'ideazione suicidaria durante terapia antidepressiva) o su effetti non necessariamente attribuibili alla terapia in corso (p.es. morte per insufficienza cardiaca) serve a tutti gli attori per attuare con convinzione e partecipazione il piano terapeutico.

... **In nessun caso** il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 **può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale**, al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

(Decreto Legge 17 febbraio 1998, n 23)

Comunicato del Ministero della Salute del 04.07.2002

... Resta fermo che, l'impiego del medicinale **a favore di un paziente ricoverato** in una struttura pubblica o privata accreditata è **a carico del Servizio sanitario nazionale**, dal momento che la tariffa di ricovero è comprensiva del costo del trattamento farmacologico praticato

Finanziaria 2007 – art. 1, comma 796, lettera z) - dispone che la fattispecie consentita dalla cd. Legge Di Bella all'art. 3 comma 2 "...non sia applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del SSN, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, **assuma carattere diffuso e sistematico** e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento..."

Legge 648/96

Consente di **erogare a carico del S.S.N.**, quando non vi è alternativa terapeutica valida, previo parere della Commissione consultiva Tecnico Scientifica dell'AIFA (CTS):

- medicinali innovativi **in commercio in altri Stati** ma non sul territorio nazionale;
- medicinali ancora **non autorizzati ma sottoposti a Sperimentazione clinica**;
- medicinali da impiegare per una **indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata**.

I medicinali che acquisiscono parere favorevole dalla CTS vengono inseriti in un **elenco**.

Per la prescrizione è necessario:

- consenso informato scritto** del paziente dal quale risulti che lo stesso è consapevole della incompletezza dei dati relativi alla sicurezza ed efficacia del medicinale per l'indicazione terapeutica proposta.
- piano terapeutico e prescrizione da parte di strutture specializzate** ospedaliere od universitarie o di IRCCS;
- dispensazione tramite il servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici**, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza del paziente

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica>

Farmaci ad uso consolidato

- Lista farmaci pediatrici cardiovascolari (aggiornata a gennaio 2010)
- Lista farmaci pediatrici antinfettivi (aggiornata a dicembre 2010)
- Lista farmaci pediatrici anestetici (aggiornata a luglio 2012)
- Lista farmaci pediatrici gastrointestinali (aggiornata a luglio 2012)
- Lista farmaci pediatrici sangue e organi eritropoietici (aggiornata a luglio 2012)
- Lista farmaci pediatrici dermatologici (aggiornata a luglio 2012)
- Lista farmaci pediatrici apparato genito-urinario e ormoni sessuali (aggiornata a luglio 2012)
- Lista farmaci pediatrici sistema nervoso e apparato muscolo-scheletrico** (aggiornata a luglio 2012)
- Lista farmaci pediatrici apparato respiratorio (aggiornata a luglio 2012)

Lista farmaci pediatrici sistema nervoso e apparato muscolo-scheletrico

Clozapina

Psicosi acute e croniche > 7 anni

Olanzapina

Schizofrenia, disturbo bipolare > 7 anni

Quetiapina

Schizofrenia, disturbo bipolare > 12 anni

➤ Piano terapeutico, consenso informato

**FARMACI CON EVIDENZA SCIENTIFICA A SUPPORTO DELL'USO IN PEDIATRIA
PER INDICAZIONI TERAPEUTICHE DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE**

ATC = M-N (Sistema nervoso e apparato muscolo-scheletrico)

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2010-11, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
CLOZAPINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida all'uso dei farmaci nei bambini per uso orale nei pazienti da 2 - 18 anni Uso in pediatria: La sicurezza e l'efficacia della Clozapina nei bambini di età inferiore ai 16 anni non sono state stabilite. È da evitare l'uso del farmaco in questo gruppo di pazienti finché non saranno disponibili ulteriori dati.	Psicosi acute e croniche nell'adolescente e nel bambino da un'età di >7 anni	^o Mattai AK, Treatment of early-onset schizophrenia. Curr Opin Psychiatry. 2010;23(4):304-10; ^o Vitiello B, et al. Antipsychotics in children and adolescents: increasing use, evidence for efficacy and safety concerns. Eur Neuropsychopharmacol. 2009;19(9):629-35; ^o Masi G, Liboni F. Management of schizophrenia in children and adolescents: focus on pharmacotherapy. Drugs. 2011;71(2):179-208	^o Sporn AL et al. Clozapine treatment of childhood-onset schizophrenia: evaluation of effectiveness, adverse effects, and long-term outcome. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;46(10):1349-56; ^o Kumra S, et al. Clozapine and "high-dose" olanzapine in refractory early-onset schizophrenia: a 12-week randomized and double-blind comparison. Biol Psychiatry. 2008;63(5):524-9; Shaw P et al. Childhood-onset schizophrenia: A double-blind, randomized clozapine-olanzapine comparison. Arch Gen Psychiatry. 2006;63(7):721-30; ^o Kumra S, et al. Childhood-onset schizophrenia. A double-blind clozapine-haloperidol comparison. Arch Gen Psychiatry. 1996;53(12):1090-7. ^o Asenjo Lobos C, et al. Clozapine versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(11):CD006633	BNF e Guida all'uso dei farmaci per i bambini: non licenziato <16 anni. Indicazioni riportate: quella per cui si richiede l'autorizzazione	La Clozapina è un "antipsicotico atipico" con una dimostrata efficacia in RCT nel trattamento della schizofrenia nell'adolescente. È stato pubblicato un solo RCT che ha incluso bambini con età >7 anni. Nelle forme di schizofrenia refrattarie ai trattamenti la clozapina sembra essere più efficace rispetto agli altri antipsicotici. Possibile comparsa di diversi effetti collaterali che vanno monitorati e che a volte richiedono la sospensione del trattamento. L'indicazione all'utilizzo degli antipsicotici atipici è discussa in letteratura con il richiamo alla necessità di condurre ulteriori RCT nel bambino (nelle forme di schizofrenia ad insorgenza precoce) e anche nell'adolescente

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 aprile 2015

Inserimento del medicinale per uso umano «Metilfenidato (Ritalin)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD) negli adulti già in trattamento farmacologico prima del compimento del diciottesimo anno di età. (Determina n. 488/2015).

GU Serie Generale n.107 del 11-5-2015

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS RECOMMENDATIONS

1. The practitioner who prescribes a drug is responsible for deciding which drug and dosing regimen the patient will receive and for what purpose.
 - a) This decision should be made on the basis of the information contained in the drug's labeling (when available) or other data available to the prescriber.
 - b) The use of a drug, **whether off or on label**, should be based on **sound scientific evidence**, expert medical judgment, or published literature whenever possible.
 - c) Off-label use is neither incorrect nor investigational if based on sound scientific evidence, expert medical judgment, or published literature.

...

Pediatrics 2014;133: 563-7.

Off-label drug use in children should be rational

Maurizio Bonati, Chiara Pandolfini

Arch Dis Child 2011;96:870–871

On/off label → On/off knowledge

Come superare il problema dell'off label

SCIENZA

- Dimensione del problema
- Quali bisogni terapeutici/quali terapie?
- Quali alternative?
- Quale grado di consenso/condivisione?
- Quali evidenze?

<http://www.kinderformularium.nl/search/index.php>